



FERTINOX

فرتینوکس

FERTINOX 10-50-10
TE
Amino Acid

فرتینوکس ۱۰-۵۰-۱۰
عناصر ریزمغذی
غنی شده با اسید آمینه

ریزمغذی ها

درصد	میلی گرم در کیلوگرم (mg/kg)						فرتینوکس
اسید آمینه	مولیبدن (Mo)	بور (B)	مس (Cu)	روی (Zn)	منگنز (Mn)	آهن (Fe)	۱۰-۵۰-۱۰
۱	۵۰	۲۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	

ترکیبات

درصد عناصر			فرتینوکس
پتاسیم (K ₂ O)	فسفر (P ₂ O ₅)	ازت (N)	۱۰-۵۰-۱۰
۱۰	۵۰	۱۰	

ترکیبی ایده‌آل برای:
رفع کمبود عناصر میکرو و ماکرو
کاملاً محلول در آب
قابل محلولپاشی و مصرف خاکی

- جذب سریع با کارایی بالا
- حاوی اسیدهای آمینه ضروری گیاه
- حاوی عناصر ریزمغذی



فرتینوکس ۱۰-۵۰-۱۰ کود کامل حاوی ازت، فسفر و پتاسیم به همراه مقدار بالایی از عناصر ریز مغذی شامل آهن، منگنز، روی، مس و بور می‌باشد. فرتینوکس ۱۰-۵۰-۱۰ برای کاهش اثر تنش‌های محیطی و مقاومت سازی گیاه برای رشد مطلوب‌تر گیاه حاوی اسیدهای آمینه ضروری گیاه می‌باشد که موجب تحریک رشد گیاه شده و سبزیگی را افزایش می‌دهد. فرتینوکس ۱۰-۵۰-۱۰ از مناسب‌ترین منابع کودی ساخته شده تا در خاک‌های شور و قلیایی بیشترین کارایی را برای گیاه داشته باشد. به طور کامل در آب حل شده و قابل استفاده در تمام سیستم‌های آبیاری و محلولپاشی می‌باشد. عناصر ریز مغذی آن به شکل کلات EDTA و حد مجاز عناصر سنگین و آلاینده در آن رعایت شده است. حاوی بیش از ۱۵ نوع اسید آمینه مفید و موثر در رشد می‌باشد که همگی از نوع اسید آمینه آزاد چپ گرد می‌باشند.



●● توصیه مصرف

مجموعه	روش مصرف	میزان مصرف	زمان مصرف
گیاهان زراعی	محلولپاشی	۳ تا ۴ کیلوگرم در هکتار	در اوایل دوره رشد تا سه بار
	همراه آبیاری	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	بعد از سبز شدن، قبل از گلدهی
درختان میوه	محلولپاشی	۲ در هزار	۳ بار در اوایل تا اواسط فصل رشد
	همراه آبیاری	۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	قبل از گلدهی و پس از برداشت
سبزیجات برگی	محلولپاشی	۲ در هزار	در اوایل دوره رشد تا سه بار
	همراه آبیاری	۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم در هکتار	هر دو تا سه هفته یکبار تا قبل از تشکیل هد
سبزیجات میوه ای	محلولپاشی	۲ تا ۳ در هزار	در اوایل دوره رشد تا سه بار
	همراه آبیاری	۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۳ برگی، قبل از گلدهی، بعد از گلدهی
گیاهان زیتنی و چمن	محلولپاشی	۲ در هزار	۲ بار در اوایل فصل رشد
	همراه آبیاری	۴ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	اوایل دوره رشد

نکات قابل توجه

- مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، رقم گیاه، زمان مصرف، وضعیت خاک، شدت کمبود و میزان عملکرد متغیر بوده و برای دقت بیشتر آزمون خاک و گیاه توصیه می‌گردد تا حداکثر عملکرد تضمین گردد.
- قابلیت سازگاری: از اختلاط آن با ترکیبات مسی و نیز ترکیبات حاوی کلسیم خودداری نمایید، ولی با اکثر کودهای کلاته و محلول قابل اختلاط است. لازم به ذکر است قبل از مصرف تست اختلاط پذیری، ضروری می‌باشد.
- توصیه‌های مصرف: محلول پاشی‌ها بایستی در صبح زود صورت گیرد تا بیشترین کارایی را داشته باشد.
- محلول پاشی در زیر نور مستقیم آفتاب احتمال بروز برگ سوزی را افزایش می‌دهد. همچنین به غلظت‌های توصیه شده برای برگ‌پاشی دقت شود.
- تولید کننده مسئولیتی در قبال عوامل خارج از کنترل کارخانه سازنده و استفاده نادرست از این محصول را بر عهده نمی‌گیرد.
- انبار داری: فرتینوکس را در بسته بندی اصلی، در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب، و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

موارد و توصیه‌های ارائه شده کلی است. با توجه به تنوع زیست بوم‌ها و نوع مدیریت کشاورزی، برای دریافت توصیه‌های دقیق، پس از انجام آزمایشات آب و خاک، با کارشناسان شرکت مشورت نمایید.