



# FERTINOX

وکس فرتینو


Fertinox 13-40-13 + MgO + TE + AA

NPK + Mgo  
TE  
Amino Acid

عناصر اصلی  
ریز مغذی  
اسید آمینه

ترکیبی ایده‌ال برای:  
رفع سریع کمبود عناصر اصلی و ریز مغذی‌ها  
مخصوص محلول‌پاشی

- تامین کننده فسفر برای گیاه
- حاوی عناصر ریزمغذی ضروری
- مناسب برای تمامی محصولات زراعی و باغی



## ریزمغذی‌ها

درصد	میلی گرم در کیلوگرم (mg/kg)						فرتینوکس
اسید آمینه	مولیبدن (Mo)	بور (B)	مس (Cu)	روی (Zn)	منگنز (Mn)	آهن (Fe)	۱۳-۴۰-۱۳
۱	۵۰	۲۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	

## ترکیبات

درصد عناصر				فرتینوکس
متیازیم (MgO)	پتاسیم (K <sub>2</sub> O)	فسفر (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	ازت (N)	۱۳-۴۰-۱۳
۰.۵	۱۳	۴۰	۱۳	



1 kg

فرتینوکس ۱۳-۴۰-۱۳ کود کامل حاوی ازت، فسفر و پتاسیم و حاوی منیزیم به همراه مقدار بالایی از عناصر ریز مغذی شامل آهن، منگنز، روی، مس و بور می‌باشد. این کود باعث کاهش اثر تنش‌های محیطی و مقاوم سازی گیاه برای رشد مطلوبتر، حاوی اسیدهای آمینه ضروری می‌باشد، که موجب تحریک رشد و افزایش سبزی‌نگی گیاه می‌شود. فرتینوکس ۱۳-۴۰-۱۳ از مناسبترین منابع کودی ساخته شده تا برای محلولپاشی بیشترین کارایی را برای گیاه داشته باشد. به طور کامل در آب حل شده و قابل استفاده در تمام سیستم‌های آبیاری و محلولپاشی می‌باشد. عناصر ریزمغذی آن به شکل کلات EDTA و حد مجاز عناصر سنگین و آلاینده در آن رعایت شده است. حاوی بیش از ۱۵ نوع اسید آمینه مفید و موثر در رشد می‌باشد که همگی از نوع اسید آمینه آزاد چپ گرد می‌باشند



### توصیه مصرف

روش مصرف	مقدار مصرف	زمان مصرف	نوع محصول
محلولپاشی	۳ تا ۵ در هزار	اوایل دوره رشد تا سه بار	گیاهان زراعی
محلولپاشی	۳ تا ۵ در هزار	اوایل تا اواسط فصل رشد و پس از برداشت محصول تا سه بار	درختان میوه
محلولپاشی	۳ تا ۵ در هزار	اوایل دوره رشد تا سه بار	سبزیجات برگی
محلولپاشی	۳ تا ۵ در هزار	اوایل دوره رشد تا سه بار	سبزیجات میوه ای
محلولپاشی	۲ در هزار	اوایل فصل رشد دو بار	گیاهان زینتی و چمن
محلولپاشی	۳ تا ۵ در هزار	اوایل بهار و پس از برداشت	پسته و مرکبات

### نکات قابل توجه

- مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، نوع گونه، زمان مصرف، وضعیت خاک، شدت کمبود متغیر می‌باشد.
- قابلیت سازگاری: از اختلاط آن با سموم و نیز ترکیبات حاوی کلسیم خودداری نمایید، و با اکثر کودهای کلاته و محلول قابل اختلاط است. لازم به ذکر است قبل از مصرف تست اختلاط پذیری، ضروری است.
- توصیه‌های مصرف: تولیدکننده مسئولیتی در قبال عوامل خارج از کنترل کارخانه سازنده و استفاده نادرست از این محصول را بر عهده نمی‌گیرد.
- محلول پاشی‌ها بایستی در صبح زود صورت گیرد تا بیشترین کارایی را داشته باشد. محلول پاشی در زیر نور مستقیم آفتاب بروز برگ سوزی را افزایش می‌دهد. غلظت‌های توصیه شده برای برگ پاشی رعایت شود.
- انبارداری: فرتینوکس را در بسته بندی اصلی، در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب، و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

موارد و توصیه‌های ارائه شده کلی است. با توجه به تنوع زیست بوم‌ها و نوع مدیریت کشاورزی، برای دریافت توصیه‌های دقیق، پس از انجام آزمایشات آب و خاک، با کارشناسان شرکت مشورت کنید.

نحوه مصرف: برگ پاشی

موارد مصرف: کلیه گیاهان باغی، زراعی، گلخانه‌ای، دارویی و فضای