



# FERTINOX

فرتینوکس

FERTINOX 18-08-30  
TE  
Amino Acid

فرتینوکس ۱۸-۰۸-۳۰  
عناصر ریزمغذی  
غنی شده با اسید آمینه

### ... ریزمغذی ها

درصد	میلی گرم در کیلوگرم (mg/kg)						فرتینوکس
اسید آمینه	مولیبدن (Mo)	بور (B)	مس (Cu)	روی (Zn)	منگنز (Mn)	آهن (Fe)	۱۸-۰۸-۳۰
۱	۲۰۰	۶۵۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	

### ... ترکیبات

درصد عناصر			فرتینوکس
پتاسیم (K <sub>2</sub> O)	فسفر (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	ازت (N)	۱۸-۰۸-۳۰
۳۰	۰۸	۱۸	

ترکیبی ایده‌آل برای:  
رفع کمبود و تامین عناصر میکرو و ماکرو  
کاملاً محلول در آب  
قابل محلولپاشی و مصرف خاکی

- جذب سریع با کارایی بالا
- حاوی اسیدهای آمینه ضروری گیاه
- حاوی عناصر ریزمغذی ضروری
- فرمول شده برای اکثر محصولات به خصوص سبزی و میوه



فرتینوکس ۳۰-۰۸-۱۸ کود کامل حاوی ازت، فسفر و پتاسیم بالا به همراه مقدار بالایی از عناصر ریز مغذی شامل آهن، منگنز، روی، مس و بور می‌باشد. فرتینوکس ۳۰-۰۸-۱۸ برای درختان میوه و سبزیجات به خصوص گونه‌های پتاس دوست مانند پسته، کاهو، گوجه فرنگی و سیب زمینی طراحی شده است. برای رشد مطلوب‌تر گیاه، حاوی اسیدهای آمینه ضروری گیاه می‌باشد که موجب تحریک رشد میوه و گیاه شده و نمو آن را افزایش می‌دهد. فرتینوکس ۳۰-۰۸-۱۸ مناسب‌ترین کود کامل برای خاک‌های شور و قلیایی می‌باشد. به طور کامل در آب حل شده و قابل استفاده در تمام سیستم‌های آبیاری و محلولپاشی می‌باشد. عناصر ریز مغذی آن به شکل کلات EDTA و حد مجاز عناصر سنگین و آلاینده در آن رعایت شده است. حاوی بیش از ۱۵ نوع اسید آمینه مفید و موثر در رشد می‌باشد که همگی از نوع اسید آمینه آزاد چپ‌گرد می‌باشند.



#### نکات قابل توجه

- مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، رقم گیاه، زمان مصرف، وضعیت خاک، شدت کمبود و میزان عملکرد متغیر بوده و برای دقت بیشتر آزمون خاک و گیاه توصیه می‌گردد تا حداکثر عملکرد تضمین گردد.
- قابلیت سازگاری: از اختلاط آن با ترکیبات مسی و نیز ترکیبات حاوی کلسیم خودداری نمایید، ولی با اکثر کودهای کلاته و محلول قابل اختلاط است. لازم به ذکر است قبل از مصرف تست اختلاط پذیری، ضروری می‌باشد.
- توصیه‌های مصرف: محلول پاشی‌ها بایستی در صبح زود صورت گیرد تا بیشترین کارایی را داشته باشد. محلول پاشی در زیر نور مستقیم آفتاب احتمال بروز برگ‌سوزی را افزایش می‌دهد. همچنین به غلظت‌های توصیه شده برای برگ‌پاشی دقت شود.
- تولید کننده مسئولیتی در قبال عوامل خارج از کنترل کارخانه سازنده و استفاده نادرست از این محصول را بر عهده نمی‌گیرد.
- انبار داری: فرتینوکس را در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب، و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

موارد و توصیه‌های ارائه شده کلی است. با توجه به تنوع زیست‌بوم‌ها و نوع مدیریت کشاورزی، برای دریافت توصیه‌های دقیق، پس از انجام آزمایشات آب و خاک، با کارشناسان شرکت مشورت نمایید.

#### ••• توصیه مصرف

محصول	روش مصرف	میزان مصرف	زمان مصرف
گیاهان زراعی	محلولپاشی	۳ تا ۴ کیلوگرم در هکتار	در اواسط دوره رشد تا سه بار
	همراه آبیاری	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	بعد از گلدهی و قبل از دانه بندی و رسیدن
درختان میوه	محلولپاشی	۲ در هزار	۳ بار در اوایل تا اواسط فصل رشد
	همراه آبیاری	۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	بعد از تشکیل میوه و در طی نمو میوه
سبزیجات برگی	محلولپاشی	۲ در هزار	در اواسط دوره رشد تا سه بار
	همراه آبیاری	۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم در هکتار	بعد از تشکیل هد، هر دو هفته یکبار
سبزیجات میوه ای	محلولپاشی	۲ تا ۳ در هزار	در اواسط دوره رشد تا سه بار
	همراه آبیاری	۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	بعد از تشکیل میوه و در طی نمو میوه
گیاهان زینتی و چمن	محلولپاشی	۲ در هزار	۲ بار بعد از گلدهی طی فصل رشد
	همراه آبیاری	۴ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	اواسط دوره رشد به بعد