



# FERTINOX

## فرتینوکس

### Fertinox 5-5-40 +MgO+ TE + AA

NPK + Mgo  
TE  
Amino Acid

عناصر اصلی  
ریز مغذی ها  
اسید آمینه

ترکیبی ایده‌ال برای:  
رفع سریع کمبود عناصر اصلی و ریز مغذی‌ها  
مخصوص محلول پاشی

- تامین کننده پتاسیم برای گیاه
- مناسب برای تمام محصولات زراعی و باغی



### ریز مغذی ها

درصد	میلی گرم در کیلوگرم (mg/kg)						فرتینوکس
اسید آمینه	مولیبدن (Mo)	بور (B)	مس (Cu)	روی (Zn)	منگنز (Mn)	آهن (Fe)	۰۵-۰۵-۴۰
۱	۵۰	۴۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	

### ترکیبات

درصد عناصر				فرتینوکس
منیزیم (MgO)	پتاسیم (K <sub>2</sub> O)	فسفر (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	ازت (N)	۰۵-۰۵-۴۰
۰ / ۵	۴۰	۵	۵	



## 1 kg

فرتینوکس ۴۰-۵-۵ کود کامل حاوی ازت، فسفر و پتاسیم و حاوی منیزیم به همراه مقدار بالایی از عناصر ریز مغذی شامل آهن، منگنز، روی، مس و بور می باشد. این کود باعث کاهش اثر تنش های محیطی و مقاوم سازی گیاه شده و برای رشد مطلوبتر حاوی اسید های آمینه ضروری می باشد که موجب تحریک رشد افزایش سبزینگی گیاه می شود. فرتینوکس ۴۰-۵-۵ از مناسبترین منابع کودی ساخته شده تا برای محلولپاشی بیشترین کارایی را برای گیاه داشته باشد. به طور کامل در آب حل شده و قابل استفاده در تمام سیستم های آبیاری و محلولپاشی می باشد. عناصر ریز مغذی آن به شکل کلات EDTA و حد مجاز عناصر سنگین و آلاینده در آن رعایت شده است. حاوی بیش از ۱۵ نوع اسید آمینه مفید و موثر در رشد می باشد که همگی از نوع اسید آمینه آزاد چپ گرد می باشند.



### ●●● توصیه مصرف

روش مصرف	مقدار مصرف	زمان مصرف	نوع محصول
محلولپاشی	۳ تا ۵ در هزار	اواسط تا اواخر دوره رشد تا سه بار	گیاهان زراعی
محلولپاشی	۳ تا ۵ در هزار	اواسط فصل رشد و قبل از برداشت محصول تا سه بار	درختان میوه
محلولپاشی	۳ تا ۵ در هزار	اواسط دوره رشد و باردهی تا سه بار	سبزیجات برگی
محلولپاشی	۳ تا ۵ در هزار	اوایل دوره رشد تا باردهی تا سه بار	سبزیجات میوه ای
محلولپاشی	۲ در هزار	در طول دوره گلدهی تا پایان دوره	گیاهان زینتی و چمن
محلولپاشی	۳ تا ۵ در هزار	اواسط دوره رشد تا قبل از رسیدن بار	پسته و مرکبات

### نکات قابل توجه

- مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، رقم گیاه، زمان مصرف، وضعیت خاک، شدت کمبود و میزان عملکرد متغیر بوده و برای دقت بیشتر آزمون خاک و گیاه توصیه می گردد تا حداکثر عملکرد تضمین گردد.
- قابلیت سازگاری: از اختلاط آن با ترکیبات مسی و نیز ترکیبات حاوی کلسیم خود داری نمائید، ولی با اکثر کودهای کلاته و محلول قابل اختلاط است. لازم به ذکر است قبل از مصرف تست اختلاط پذیری، ضروری است
- توصیه های مصرف: تولید کننده مسئولیتی در قبال عوامل خارج از کنترل کارخانه سازنده و استفاده نادرست از این محصول را بر عهده نمی گیرد.
- محلول پاشی ها بایستی در صبح زود صورت گیرد تا بیشترین کارایی را داشته باشد. محلول پاشی در زیر نور مستقیم آفتاب احتمال بروز برگ سوزی را افزایش می دهد. غلظت های توصیه شده برای برگ پاشی رعایت شود.
- انبار داری: فرتینوکس را در بسته بندی اصلی، در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب، و دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

موارد و توصیه های ارایه شده کلی است. با توجه به تنوع زیست بوم ها و نوع مدیریت کشاورزی، برای دریافت توصیه های دقیق، پس از انجام آزمایشات آب و خاک، با کارشناسان شرکت مشورت کنید

نحوه مصرف: برگ پاشی

موارد مصرف: کلیه گیاهان باغی، زراعی، گلخانه ای، دارویی و فضای سبز