

## توصیه عمومی کودی فندق

مقدار مصرف	نحوه مصرف	نوع کود	زمان
۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب	محلولپاشی	اوره	در زمان تورم جوانه ها (قبل از باز شدن)
۳ لیتر در هزار لیتر آب		زیبو نوکس	
۱۵ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	FERTINOX ۱۰-۵۰-۱۰	پس از اتمام گلدهی در آبیاری اول
۵ لیتر در هکتار		مگاهومات بن	
۲ لیتر در هزار لیتر آب	محلولپاشی	میکرونوا	تشکیل شدن میوه
۵ لیتر در هکتار	کود آبیاری	لیکوفوس	
۳ لیتر در هزار لیتر آب	محلولپاشی	کالبونوکس	فندق شدن میوه
۵ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	FERTINOX ۲۰-۲۰-۲۰	
۲ لیتر در هزار لیتر آب	محلولپاشی	میکرونوا	قبل از پر کردن مغز
۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب		FERTINOX ۲۰-۲۰-۲۰	
۱۰ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	FERTINOX ۲۰-۲۰-۲۰	سفت شدن پوست استخوانی
۲ لیتر در هزار لیتر آب	محلولپاشی	پتانوا	
۱۰ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	FERTINOX ۱۸-۰۸-۳۰	پر کردن مغز
۳ لیتر در هزار لیتر آب	محلولپاشی	کالبونوکس	
۱۰ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	FERTINOX ۱۰-۰۴-۴۴	بعد از برداشت
۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	محلولپاشی	FERTINOX ۲۰-۲۰-۲۰	
۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	محلولپاشی	FERTINOX ۱۳-۴۰-۱۳	
۲ لیتر در هزار لیتر آب		زیبو نوکس	

مقدار هر کود در هر مقطع را بر تعداد وعده های آبیاری در هر مقطع تقسیم نمایید به این معنی که این مقدار کود در نوبت های آبیاری بطور مساوی تقسیم شود.

کودهایی که در جدول به صورت رنگی نشان داده شده است امکان اختلاط با کودهای دیگر را ندارند.

بهترین زمان مصرف صبح زود یا بعد از ظهر است که رطوبت هوا به بالاترین میزان ممکن رسیده باشد. جهت جلوگیری از گیاه سوزی از محلول پاشی در هنگام ظهر و هوای گرم اجتناب شود.

مقادیر فوق برای یک برنامه جامع تغذیه برای برداشت حداکثر محصول در نظر گرفته شده است اما در صورتی که حتی یک یا قسمتی از این برنامه اجرا شود اثرات مطلوب نسبی را در بر خواهد داشت.

توصیه می گردد محلول پاشی ها را پس از هر بارندگی انجام دهید. و در صورت فقدان بارش های فصلی از محلولپاشی خودداری نمایید.



**بنیز تجهیز**

مشاور تغذیه گیاهی  
تامین کننده کودهای ماکرو و میکرو

تلفن: ۵-۰۸۳-۲۲۴۶۸۰۲۱

www.beniztajhiz.com