



CALBONOX

وکس کالبون

Calcium (10%)
Boron (2%)
Amino Complex (5%)

کود مایع کلسیم
بور
ترکیبات آمینی

ترکیبی ایده‌ال برای:
رفع سریع کمبود کلسیم و بر
افزایش کیفیت محصول

- جذب سریع با کارایی بالا
- کمپلکس شده با ترکیبات آمینه‌ای
- افزایش ماندگاری و سفتی بافت میوه‌ها



... ترکیبات

درصد (w/v)	
بور	کلسیم
۲	۱۰



کلسیم و بور دو عنصر مهم و اساسی در تقسیم و تمایز سلولی می باشد. فقدان کلسیم و بور رشد و تمایز سلولهای مریستمی را کاهش داده و تشکیل پوست را در میوه ها دچار اختلال می کند. کلسیم و بر نقش اساسی در تلقیح و گرده افشانی موثر داشته و تشکیل میوه را افزایش می دهد. فقدان بور موجب کور شدن و سقط میوه ها شده و کلسیم نیز از ریزش میوه جلوگیری می کند. ترکیب کلسیم و بور به همراه عامل آمینه ای کمپلکس شده با آن در رشد و سایز بندی مناسب میوه موثر بوده و کیفیت و ماندگاری آن را تضمین می کند. کلسیم و بور برای تلقیح مناسب گوجه فرنگی گلخانه ای، و جلوگیری از سقط میوه در خیار گلخانه ای موثر بود و رشد و سفتی بافت میوه توت فرنگی و سیب درختی را افزایش می دهد.



●●● توصیه مصرف

تکرار	میزان مصرف در هزار لیتر آب	زمان مصرف	نوع محصول
۳ تا ۴ بار در طول فصل	۲-۳ لیتر	زمان تورم جوانه ها، قبل از گلدهی، بعد از تشکیل میوه و در زمان ریزش میوه	سیب ، گلابی و به
۳ تا ۴ بار در طول فصل	۲-۳ لیتر	تورم جوانه ها، قبل از گلدهی، ارزنی شدن - پس از برداشت میوه	پسته، فندق، گردو
۲ تا ۳ بار در طول فصل	۳-۳ لیتر	قبل از گلدهی، بعد از ریزش گلبرگ ها	انار، انجیر، زیتون
۲ تا ۳ بار در طول فصل	۲-۳ لیتر	قبل از گلدهی، بعد از تشکیل خوشه، در زمان غوره شدن	انگور
۲ بار در طول فصل	۳-۳ لیتر	قبل از گلدهی، بعد از تشکیل میوه	مرکبات
۲ بار در طول فصل	۲-۳ لیتر	قبل از ساقه روی ، قبل از خوشه روی	ذرت، برنج، گندم
۲ تا ۳ بار در طول فصل	۲-۳ لیتر	۴ تا ۵ برگ، قبل از گلدهی، بعد از تشکیل میوه	کدوئیان و سبزیجات
۲ تا ۳ بار در طول فصل	۲-۳ لیتر	قبل از گلدهی، بعد از گلدهی و میوه دهی	خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای
۲ تا ۳ بار در طول فصل	۲-۳ لیتر	قبل از گلدهی، بعد از تشکیل میوه ، قبل از رنگ گیری میوه	توت فرنگی

نکات قابل توجه

- از مصرف زیاد از حد یا با غلظت بیش از اندازه توصیه شده پرهیز کنید. محلول پاشی با غلظت بیش از ۱/۵ در هزار ممکن است در محصولات حساس ایجاد برگسوزی نماید.
- در خاکهایی که مسمومیت بور وجود دارد یا گیاهانی که به دلیل مصرف زیاد کودهای حاوی بور دچار مسمومیت شده اند از محلول پاشی این کود اکیدا خودداری نمایید.
- در زمان گلدهی درختان میوه به خصوص درختان هسته دار نظیر هلو و شلیل از محلول پاشی آن خودداری فرمایید و قبل یا بعد از این مرحله اقدام به مصرف نمایید.
- موارد مصرف: کلیه گیاهان زر اعی، باغی و گلخانه ای به صورت محلول پاشی. مصرف به شکل خاکی این کود توصیه نمی گردد.