



LIQUFOS

لیکوفوس

Phosphate
Zinc

کود مایع فسفات
روی

ترکیبات

درصد (w/v)		
روی (Zn)	فسفر (P ₂ O ₅)	نیترژن (N)
۲	۳۰	۵

ترکیبی ایده‌ال برای:
رفع سریع کمبود فسفر
باردهی و گل انگیزی در گیاهان
مناسب برای تلقیح گل‌ها
رشد سریع گیاه و زودرسی

- افزایش تشکیل بذر
- کاملا اسیدی و مناسب برای آبیاری قطره‌ای
- جذب بهتر ریشه‌ها و افزایش تراکم ریشه‌ها
- تولید هورمون‌های رشد در اندام‌های هوایی و ریشه



لیکوفوس کود مایع فسفات و اسیدی شده است که مناسب برای خاک‌های آهکی و قلیائی که از رسوب گذاری بلافاصله فسفر در خاک جلوگیری می‌کند. حلالیت و نفوذپذیری فسفات آن در خاک به دلیل کند رها بودن آن و استفاده از روان کننده سطحی مناسب، در مقایسه با سایر کودهای فسفات محلول در آب بالا تر بوده و جذب آن را برای گیاه افزایش می‌دهد. بنیان فسفات این محصول تقویت شده، تا پایداری بیشتری در شرایط نامتعادل خاک به خصوص pH بالا داشته باشد. به دلیل اسیدی شدن ناحیه ریشه حلالیت فسفر و سایر عناصر ریز مغذی نظیر روی و منگنز و آهن افزایش یافته و پس از مصرف هر بار این کود شاهد افزایش سبزیگی بیشتر گیاه می‌باشید. لیکوفوس در ابتدای فصل رشد موجب رشد سریع ریشه و موجب استقرار به موقع گیاهان نشایی می‌شود. لیکوفوس مناسب برای گلدهی و باردهی بهتر در گیاهان زراعی و درختان میوه است. مصرف فسفات و روی همراه هم، موجب سنتز بهتر هورمون‌ها در گیاه شده و عملکرد آنرا افزایش می‌دهد. لیکوفوس طول دوره باردهی را افزایش داده و در محصولات صیفی نظیر خربزه، طالبی و هنداونه باردهی را تسریع می‌کند. مصرف لیکوفوس در درختان میوه هم در ابتدای فصل و هم پس از برداشت برای باردهی بهتر در سال بعد توصیه می‌گردد. لیکوفوس برای تحریک گیاهان به خصوص درختان میوه برای گلدهی کامل و کاهش سال آوری به خصوص پسته و زیتون و سیب مناسب می‌باشد.



توصیه مصرف

نوع محصول	زمان مصرف	مصرف
سیب ، گلابی و به	قبل از گلدهی، بعد از تشکیل میوه و پس از برداشت میوه	۱۰ لیتر در هکتار در هر مرحله
پسته، فندق، گردو	قبل از گلدهی، ارزنی شدن، در زمان پر کردن و پس از برداشت	۱۰ لیتر در هکتار در هر مرحله
انار، انجیر، زیتون	قبل از گلدهی، پس از برداشت	۱۰ لیتر در هکتار در هر مرحله
انگور	قبل از گلدهی، بعد از تشکیل خوشه، پس از برداشت	۱۰ لیتر در هکتار در هر مرحله
مرکبات	قبل از گلدهی، بعد از تشکیل میوه، پس از برداشت	۱۰ لیتر در هکتار در هر مرحله
ذرت، برنج، گندم، کلزا، سویا	قبل از پنجه زنی در آب اول یا دوم ، قبل از گلدهی	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار در هر مرحله
کدوئیان و سبزیجات	۴ تا ۵ برگی، قبل از گلدهی، بعد از تشکیل میوه	۱۰ لیتر در هکتار در هر مرحله
چغندر قند	۸ برگی، قبل از تشکیل غده، قبل از شروع قندی شدن	۵ لیتر در هکتار هر مرحله
پنبه	قبل از گلدهی، قبل از تشکیل غوزه	۵ لیتر در هکتار هر مرحله
خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای	قبل از گلدهی، بعد از گلدهی و میوه دهی	۱۰ لیتر در هکتار در هر مرحله
توت فرنگی	بعد از نشاء کردن، قبل از گلدهی ، قبل از تشکیل بذر روی میوه	۱۰ لیتر در هکتار در هر مرحله

نکات قابل توجه

- از اختلاط این کود با کودهای کلسیمی و هیومیکی خودداری نمایید.
- قابل اختلاط با اکثر کودها می باشد.
- مصرف هر ساله آن برای درختان پسته، زیتون و انگور و چغندر قند برای عملکرد مطلوب توصیه می‌شود.
- توصیه می‌شود این کود را از طریق ریشه مصرف نمایید. در صورتی که نیاز به محلول پاشی وجود دارد با کارشناسان شرکت مشورت نمایید و راهنمایی مناسب را دریافت نمایید.
- توصیه مصرف محلول پاشی :
- درختان میوه : ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب
- سبزی های برگی و صیفی جات: ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب

• محصولات زراعی و غلات: ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب
 • موارد مصرف: کلیه گیاهان زراعی، باغی و گلخانه ای