

توصیه عمومی کودی پیاز

مقدار هر کود در هر مقطع را بر تعداد وعده های آبیاری در هر مقطع تقسیم نمایید به این معنی که این مقدار کود در نوبت های آبیاری بطور مساوی تقسیم شود.

کودهایی که در جدول به صورت رنگی نشان داده شده است امکان اختلاط با کودهای دیگر را ندارند.

بهترین زمان مصرف صبح زود یا بعد از ظهر است که رطوبت هوا به بالاترین میزان ممکن رسیده باشد. جهت جلوگیری از گیاه سوزی از محلول پاشی در هنگام ظهر و هوای گرم اجتناب شود.

مقادیر فوق برای یک برنامه جامع تغذیه برای برداشت حداکثر محصول در نظر گرفته شده است اما در صورتی که حتی یک یا قسمتی از این برنامه اجرا شود اثرات مطلوب نسبی را در بر خواهد داشت.

توصیه می گردد محلول پاشی ها را پس از هر بارندگی انجام دهید. و در صورت فقدان بارش های فصلی از محلولپاشی خودداری نمایید.

مقدار مصرف	نحوه مصرف	نوع کود	زمان
	بذور با مگاهومات بذر مال می شوند. برای این منظور ۲ لیتر مگاهومات را با ۲ لیتر آب رقیق کرده و برای اندود کردن ۱۰۰ کیلوگرم بذر استفاده می کنید.	مگاهومات بن	زمان کاشت
۱۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری	لیکوفوس	آبیاری اول (پس از سبز شدن)
۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	اوره	در مرحله چند برگی شدن
۱۰ لیتر در هکتار		مگاهومات بن	
۲۵ کیلوگرم در هکتار		FERTINOX ۱۰-۵۰-۱۰	
۳ در هزار	محلولپاشی	میکرونوا	
۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	اوره	مرحله تشکیل پیاز
۵ لیتر در هکتار		مگاهومات بن	
۲۵ کیلوگرم در هکتار		FERTINOX ۲۰-۲۰-۲۰	
۳ در هزار	محلولپاشی	سیلینوکس	
۳۰ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	FERTINOX ۱۸-۰۸-۳۰	فندق شدن پیاز
۱۰ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	FERTINOX ۱۰-۰۴-۴۴	گردویی شدن پیاز
۳ در هزار	محلولپاشی	کالبونوکس	
۱۰ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	FERTINOX ۰-۰-۵۱	پیازی شدن (قبل از رنگ گیری)



بنیز تجهیز

مشاور تغذیه گیاهی
تامین کننده کودهای ماکرو و میکرو

تلفن: ۵-۰۸۳-۲۲۴۶۸۰۲۱

www.beniztajhiz.com