

توصیه عمومی کودی یونجه

مقدار هر کود در هر مقطع را بر تعداد وعده های آبیاری در هر مقطع تقسیم نمایید به این معنی که این مقدار کود در نوبت های آبیاری بطور مساوی تقسیم شود.

کودهایی که در جدول به صورت رنگی نشان داده شده است امکان اختلاط با کودهای دیگر را ندارند.

بهترین زمان مصرف صبح زود یا بعد از ظهر است که رطوبت هوا به بالاترین میزان ممکن رسیده باشد. جهت جلوگیری از گیاه سوزی از محلول پاشی در هنگام ظهر و هوای گرم اجتناب شود.

مقادیر فوق برای یک برنامه جامع تغذیه برای برداشت حداقل محصول در نظر گرفته شده است اما در صورتی که حتی یک یا قسمتی از این برنامه اجرا شود اثرات مطلوب نسبی را در بر خواهد داشت.

توصیه می گردد محلول پاشی ها را پس از هر بارندگی انجام دهید . و در صورت فقدان بارش های فصلی از محلولپاشی خودداری نمایید.

مقدار مصرف	نحوه مصرف	نوع کود	زمان
۲ لیتر مگاهومات همراه ۲ لیتر آب جهت بذر مال ۱۰۰ کیلو بذر	بذر مال کردن بذور	مگاهومات بن	مرحله کاشت
۱۰ لیتر در هکتار ۲۰ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	مگاهومات بن FERTINOX ۱۰-۵۰-۱۰	آب دوم (مرحله ۲ تا ۳ برگی)
۳ لیتر در هزار لیتر آب		میکرونوا	پس از پنجه انداختن
۲۰ کیلوگرم در هکتار ۱۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری	FERTINOX ۱۸-۰۸-۳۰ مگاهومات بن	سه هفته پس از پنجه انداختن
۳ لیتر در هزار لیتر آب		سیلینوکس	

پس از چین اول دوباره سه مرحله آخر کود دهی تکرار می شود



مشاور تغذیه گیاهی
تامین کننده کودهای ماکرو و میکرو

تلفن: ۰۲۱-۳۴۶۸۰۸۳۰-۵

www.beniztajhiz.com