

توصیه عمومی کودی زیتون

| مقدار مصرف | نحوه مصرف | نوع کود | زمان |
|------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| ۳ لیتر در هزار لیتر آب | محلولپاشی | زیبو نوکس | قبل از گلدهی (حدود ۳ هفته قبل) |
| ۱۵ کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری | FERTINOX ۱۰-۵۰-۱۰ | |
| ۱۰ لیتر در هکتار | | مگاهومات بن | |
| ۳ لیتر در هزار لیتر آب | محلولپاشی | میکرونوا | پس از تشکیل میوه |
| ۱۰ کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری | FERTINOX ۱۸-۰۸-۳۰ | |
| ۱۰ لیتر در هکتار | | مگاهومات بن | |
| ۳ لیتر در هزار لیتر آب | محلولپاشی | سیلینوکس | هنگام درشت شدن میوه |
| ۱۵ کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری | FERTINOX ۱۰-۰۴-۴۴ | |
| ۳ لیتر در هزار لیتر آب | محلولپاشی | زیبو نوکس | پس از برداشت |

مقدار هر کود در هر مقطع را بر تعداد وعده های آبیاری در هر مقطع تقسیم نمایید به این معنی که این مقدار کود در نوبت های آبیاری بطور مساوی تقسیم شود.

کودهایی که در جدول به صورت رنگی نشان داده شده است امکان اختلاط با کودهای دیگر را ندارند.

بهترین زمان مصرف صبح زود یا بعد از ظهر است که رطوبت هوا به بالاترین میزان ممکن رسیده باشد. جهت جلوگیری از گیاه سوزی از محلول پاشی در هنگام ظهر و هوای گرم اجتناب شود.

مقادیر فوق برای یک برنامه جامع تغذیه برای برداشت حداکثر محصول در نظر گرفته شده است اما در صورتی که حتی یک یا قسمتی از این برنامه اجرا شود اثرات مطلوب نسبی را در بر خواهد داشت.

توصیه می گردد محلول پاشی ها را پس از هر بارندگی انجام دهید. و در صورت فقدان بارش های فصلی از محلولپاشی خودداری نمایید.



بنیز تجهیز

مشاور تغذیه گیاهی

تامین کننده کودهای ماکرو و میکرو

تلفن: ۵-۰۸۳-۲۲۴۶۸۰۲۱

www.beniztajhiz.com